

Observations sur L'abus du forceps, dans certains cas, de la pratique des Accouchements

Dans les Accouchements, comme dans les autres parties
de la Chirurgie, il faut plus de savoir pour prévenir, que pour faire
une opération, le plus grand art est de l'éviter, et d'y soustraire
son malade, on ne saurait donc trop s'appliquer, à distinguer les
cas qui l'exigent absolument, de ceux qui peuvent la faire
rejeter, ou simplement la retarder. la nature trouve en soi, des
ressources infinies, qui bien ménagées, réussissent lors même qu'on
la croyait prête à succomber. Pourquoi donc, si souvent abandonner
les moyens propres à la rappeler vers le but où elle tend, pour
recourir à des expédients cruels, et souvent homicides? je le demande,
aux Accoucheurs, qu'une sage pratique a vieilli; y a-t-il dans
les Accouchements, tant de cas qui exigent absolument l'emploi
des instruments? de nos jours l'on en fait si souvent usage,
n'est-ce pas, parce qu'il en coûte beaucoup plus à l'ignorance,
d'imiter ou d'aider la Nature, que de l'imiter ou d'usurper ses droits.
Disons mieux; le goût pour les instruments, n'en fait-il
point, chez des Praticiens prévenus, des fantômes à combattre,
qui les éloignent des véritables indications? qu'il nous soit



Permis d'en donner des exemples.

Tous les Accoucheurs. Savaient, que des que la tête du fœtus, vient se présenter au détroit Supérieur du petit bassin, elle s'y engage par son extrémité postérieure, dans la direction du diamètre oblique de gauche à droit; (C'est moins cette situation est celle, que l'on observe le plus fréquemment.) Sous qu'elle ait lieu, il n'est pas nécessaire comme on l'a pensé, que la tête ait trouvé des obstacles au détroit Supérieur, et qu'elle fût pressée contre le Sacrum, et y trouvant une saillie analogue à la sienne, glisse sur cette avance, et tourne à droit ou à gauche, de manière que l'occiput vienne se présenter le premier au devant du bassin. Cette direction de l'occiput, vers l'orifice de la matrice, et l'axe du bassin, est déterminée. Dès les premières douleurs de l'auouchement, et même avant que l'orifice utérin soit suffisamment dilaté, c'est un fait, dont on peut se convaincre tous les jours par le toucher. On en trouve la raison, dans la flexible mobilité de la tête, sur la partie antérieure du corps, de manière que lorsque la matrice revient sur elle même, et agit sur les fœtus de l'enfant qui lui répondent, la tête ne peut avancer, sans que le menton ne se flexisse sur la poitrine, et que l'occiput ne s'abaisse. C'est ainsi le fait d'ailleurs d'autant plus aisément, qu'étant une suite de la colonne vertébrale, il éprouve plus directement, et

plus fortement que le front, l'effet des contractions utérines; aussi selon les
 progrès de dilatation de l'orifice utérin, l'occi put s'engager plus ou moins
 par son extrémité ou sa pointe, et avance ensuite dans le bassin avec
 d'autant plus de facilité, que ses dimensions ne surpassent aucun des
 diamètres du détroit supérieur, aussi continue-t-il d'y descendre, en suivant
 l'axe de ce détroit, jusqu'à ce qu'il soit parvenu à la partie inférieure d'un
 des trous ovalaires; alors il ne peut plus avancer, parce que le sacrum
 droit répond à l'arcade des pubis, qui ne peut le recevoir. Dans cet état, l'occi put
 éprouvant de la résistance, poussé toujours par les forces utérines, tend à
 s'échapper par l'endroit qui lui résiste le moins; trouvant près de lui l'arcade
 des pubis, il s'y engage d'autant plus aisément qu'il y présente une
 surface plus analogue; mais il ne peut le faire, sans que le front, qui
 répond à l'échancrure sacro-sciatique droite, ne se rapproche de la cavité du
 Sacrum, ou il trouve aussi moins de résistance. celui-ci y avance même
 avec d'autant plus de facilité que le fond de la matrice, répondant le plus
 ordinairement au Nombril de la femme, porte sa force expulsive
 obliquement de devant en arrière, suivant la direction du sacrum, qui a une
 figure concave, et propre à le loger. mais dès qu'il y est descendu, et que les
 contractions utérines agissent, la tête est obligée d'échanger de direction.
 en effet étant jusques là descendue d'avant en arrière, elle est alors contrainte
 d'être portée d'arrière en avant, à cause du plan oblique, et de la courbure
 que lui présentent la partie inférieure du sacrum, et du fœtus, qui la
 portent nécessairement en avant. mais le visage ne peut s'arrêter. la



Courbure du sacrum, sans quel occiput ne s'engage de plus en plus, sous l'arcade des pubis, sous laquelle il se relève facilement, parceque cette arcade présentant plus de largeur dans sa partie inférieure, donne la liberté aux parietaux de s'y engager à mesure que ceux cy y avancent, l'occiput se dégage de plus en plus de l'arcade des pubis, et fait saillie au dessus de la commissure antérieure des grandes lèvres; alors le front, et le menton passent successivement sur les dernières vertèbres du sacrum, et sur celles du Coccyx, font faire saillie au périnée, et se relèvent bientôt au dessus de la commissure postérieure des grandes lèvres; mais à peine le visage a-t-il passé la vulve, qu'il se tourne bientôt vers un des côtés du bassin; alors les contractions utérines, ne tardent pas de faire avancer les épaules dans le petit bassin, en changeant leur première direction, et d'expulser ensuite le reste du Corps.

Celle est la marche la plus naturelle, et la plus constante, que suit la tête, dans un bassin bien conformé; et lorsque les contractions utérines agissent sur l'enfant selon l'axe du bassin. Toutes les fois que la nature s'en écarte, l'accouchement devient plus long et plus difficile; aussi est-ce vers elle, qu'on doit la ramener, sans quoi on s'expose à des opérations meurtrières, ou le plus souvent impossibles.

en effet, supposons que l'occiput, au lieu d'descendre selon la direction de l'un des diamètres obliques du détroit supérieur, s'engage selon celle du diamètre transversal, alors les contractions utérines, venant à agir sur les fesses de l'enfant, plongent l'extrémité occipitale dans l'intérieur du bassin. celle ci y descend le long du plan oblique, quelui présente le corps et la branche supérieure de l'ischium, mais l'arrivée du latubérosité

inhiatique, elle ne peut avancer plus loin, parce qu'une des bones parietales
 répond au pubis qui ne peut la recevoir. Dans cet état, les contractions utérines
 continuant toujours. L'agio, font baisser le fœtus, qui se trouve plus libre, et
 plus élevé quel ouïput, le menton demeure quitta la poitrine en proportion,
 mais le front ainsi descendu, se trouvant trop éloigné de la cavité du sacrum
 ne peut y glisser. L'ouïput demeurant peut s'échapper sous l'arcade des
 pubis, dont il est aussi également loin; alors la tête présente son diamètre longitudinal
 de quatre pouces un quart, dans la direction du diamètre transversal du détroit
 inférieur, qui n'a environ que quatre pouces. De là les disproportions qui se
 trouvent entre la tête, et la cavité du bassin, s'opposent à la sortie de celle-ci,
 et rendent les contractions utérines inefficaces et inutiles. (A) Dans cette circonstance,
 l'aide nature cause le plus ordinairement la nature d'impuissance, s'empresse
 d'employer les ressources de l'art, et croit les trouver dans l'application du forceps;
 mais il s'en faut beaucoup, que cet instrument remplisse le but qu'on se
 propose. en effet, si dans cette position transversale de la tête, on applique
 le forceps latéralement, ainsi que l'indiquent plusieurs auteurs, alors les
 cuillers de cet instrument doivent manquer de prise, dès la première contraction,
 parce qu'elles ne peuvent s'adapter comme il faut au levirage et l'ouïput.
 Si pour éviter cet inconvénient, on enserre assez fortement les branches,
 on ne réussit pas mieux, car l'ouïput à cause de sa forme arrondie et sa
 ne peut donner une prise suffisante, et le levirage est alors exposé à des
 contusions dangereuses. D'ailleurs l'affaissement quel'on fait subir à la tête,
 au moyen d'une forte pression, se trouve avoir lieu dans tous les points de la
 circonférence; aussi l'ouïput et le levirage comprimés ne peuvent tendre
 à se rapprocher, sans que les parietaux ne se déjettent en dehors, ce qui
 augmente leur largeur et leur hauteur, et conséquemment la difficulté
 qu'ils auraient à s'engrainer entre l'arcade des pubis, et si on s'est fait

(A) Les mêmes obstacles ont lieu, lorsque la tête se présente dans une position avantagieuse au détroit supérieur,
 si le front se développe trop dans la cavité du petit bassin, avant que l'ouïput ait gagné l'arcade des pubis
 et un chemin proportionné à lui.



quelques efforts pour y réussir; la tête s'écartera, pressée dans tous les points, et le cerveau du fœtus, si faiblement garanti, est exposé à une compression le plus souvent mortelle.

On n'évite pas davantage ces inconvénients, en plaçant le forceps le long des oreilles. d'abord on ne peut y parvenir qu'avec la plus grande difficulté, surtout si l'on cherche à introduire une des cuillères sous le pubis en la passant saucièrement sur le front, la tempe, et le visage; en effet, l'on décrit ainsi un quart de cercle, qu'on ne peut parcourir sans mutiler le fœtus. il faut d'ailleurs baigner le manche du forceps, beaucoup plus bas que le périnée ne peut le permettre, d'ailleurs sans déchirure. Si l'on veut introduire des branches, directement sous le pubis et sous le sacrum, on ne réussit pas mieux, puisque les bosses pariétales sont exactement en contact, et ne permettent guères l'admission des cuillères. d'ailleurs pour en introduire une, au devant du sacrum, combien ne faut-il pas ^{en} baisser le manche. Le périnée le permettrait-il sans désavantage? mais supposons qu'avec de l'adresse, et de la patience, on soit parvenu à saisir les parties latérales de la tête, alors les bosses pariétales serrées et comprimées entre les cuillères du forceps, doivent s'applatisir transversalement, et donneront en proportion de leur réduction plus d' longueur au diamètre longitudinal de la tête, ce qui augmente davantage les obstacles, puisque ce diamètre a déjà trop d'étendue. si on fait de fortes attractions et de fortes pressions, on court les risques de casser son instrument, plutôt que de faire céder la tête, et on expose cette dernière à une compression dangereuse, puisque ne pouvant s'allonger du front à l'occiput, d'où elle est en contact intime avec les parties aux os du bassin, il n'y aura que les variétés à céder, et à se chevaucher l'un sur l'autre, ce qui peut arriver, sans que

le fœreau n'éprouve essentiellement le dérangement le plus fâcheux. D'un
autre côté, si on cherche seulement à ramener l'œuf sous l'arcade des
pubis, afin de faire repousser le plus grand diamètre de la tête, à celui du
^{détroit inférieur} ~~pubis~~, alors on ne peut réussir qu'avec les plus grandes forces, si l'on
ne débarrasse en même temps le front, puisque l'œuf ne peut s'écarter
l'espace suffisant pour gagner l'arcade des pubis, sans que le col, qui est très
mobile, n'éprouve une torsion dangereuse.

Ce n'est pas gratuitement que dans ce cas, nous attribuons au
forceps, tous les défauts que nous venons de détailler. L'observation se trouve
d'accord avec le raisonnement; Boissier nous en fournit une observation
dont voici le précis: (A)

Il parle d'une femme dont le travail était long et laborieux; il
l'avait saignée, et lui avait fait prendre des calmants, sans que
l'accouchement avançât davantage.



„ J'observai, dit-il, qu'il se formait peu à peu, une tumeur sur la tête
„ ainsi arrêtée, et dont je ne reconnus qu'alors la mauvaise situation; le visage
„ était tourné vers l'un des os ischium, et l'œuf vers l'autre. Je mis tout en
„ œuvre pour le dégager sans avoir recours aux instruments. Je ne pus introduire
„ ma main entre le bassin et la tête, pour débarrasser les épaules arrêtées sur
„ les os du bassin, j'en portai le plus avant qu'il me fut possible, dans l'intention
„ d'en servir comme de levier, pour dégager et faire descendre la tête. mes forces
„ furent inutiles: j'en aurais pas mieux réussi en me servant pour levier de l'une
„ des branches du forceps. cependant le sang qui coulait assez abondamment ne me
„ laissa plus aucun lieu de douter, de la tension du Cordon, et du décollement

11 D'une partie du Placenta. &c.

après plusieurs autres tentatives aussi peu réfléchies, et aussi inutiles
que les précédentes, enfin Boëdère qui un moment auparavant, avait
reconnu l'inutilité du forceps, se décide à l'employer et continue ainsi:

- 11 Après donc avoir donné quelque repos à la femme, pour rétablir
11 ses forces, j'appliquai le forceps suivant les règles de l'art. j'en saisis, et
11 j'en serrai fortement les branches, après les avoir jointes. comme je
11 connoissais la mauvaise situation de la tête, j'essayai de la repousser
11 un peu, et de la ramener dans une situation droite, mais ce fut sans
11 succès. le fœtus était trop intimement embrassé par la matrice, et le
11 vagin, il fallait par conséquent tirer tout simplement, et abaisser
11 peu à peu les épaules. entrant le forceps, et appuyant contre le bruié
11 je dilatai assez les lames, pour y faire entrer l'ociput, mais il restait un
11 obstacle invincible, et malgré toute la force, avec laquelle je serrai
11 les branches du forceps, il lâcha prise, le sang commença de nouveau
11 à couler, je replaçai le forceps, et il me fallut jusqu'à plus de sept fois
11 le tirer comme cy devant avec force, avant que d'épouvoir dégager la tête.
11 j'étais un petit intervalle entre chaque opération, pour ménager
11 la mère, il est même arrivé qu'à force de tirer le forceps, l'une des
11 branches s'est allongée, au point de devenir droite, par la forte
11 compression des parties environnantes, ce qui lui fit encore la prise
11 prise, je le replaçai &c. &c.

Cet tableau suffirait sans doute, pour détourner de l'emploi
du forceps en pareil cas, néanmoins nous observerons que Boëdère,
n'est pas le seul qui ait éprouvé autant d'obstacles.

Finellie qui connaissait si bien l'art de manier et instrument
avec avantage, n'en a pas moins dans ce cas, éprouvé toute l'infirmité,
et voici comme il s'explique dans l'une de ses observations. (A)

71 Les Parietaux commencerent à secher au choc, le cuir chevelu se relacha,
11 et se vida, et la tête se trouva enfin poussée insensiblement, jusqu'au bas
11 du bassin, ou elle demeura pendant un tems considerable. l'ociput étoit
11 fortement comprimé contre la partie inférieure de l'ischium du côté droit,
11 pendant que la fontanelle antérieure répondait à la partie inférieure du sac il
11 ou du côté gauche. &c.



Finellie après avoir attendu inutilement la sortie Naturelle
de la tête, recourut à l'emploi du forceps et continua ainsi.

11 Enfin voyant la malade s'affoiblir de plus en plus, et ne s'voyant
11 pas qu'il y eut rien à attendre de mieux de la part du travail, j'introduisis
11 le forceps, la malade étant couchée sur le côté. pour lors je profitai de toutes
11 les douleurs, pendant les quelles, j'eus soin de faire descendre la tête plus bas,
11 et de faire tourner le front en arriere vers les sacrum. Malheureusement
11 mon instrument vint à glisser, sur les entrefaites, ce qui m'obligea à le
11 désappareiller, pour le faire remonter par dessus les oreilles. alors ayant
11 fait de nouveaux efforts, et ayant eu l'attention de lier les branches
11 du forceps, pour serrer davantage, il parvint enfin avec beaucoup de
11 peine à délivrer la malade.

11 L'enfant qui avait la tête fort allongée, fut d'abord attaqué
11 de convulsions qui se dissipèrent avec la précaution, de laisser couler

11) Deux à trois cuillerées de sang avant que d'élire le forceps.

Quiconque lira cette observation, conviendra que l'enfant était heureux, d'avoir pu réussir à extraire la tête, et qu'il était encore plus heureux pour l'enfant, de n'être pas mort des convulsions dont la trop forte compression du forceps était sans doute la cause.

Mais quelquefois le forceps est si serré, qu'au lieu de s'allonger comme Noëderer l'a éprouvé, il se casse plutôt que de manquer prise.

J'ai dû vous transmettre
le fait que mentionne
ici mon oncle: je n'en
étais que l'historien
et non le rapporteur
dans mes leçons
mais je n'en suis
pas le rapporteur
et non le rapporteur
suis

M. Baudeloque, dont l'adresse, et les talents sont en pareil cas, ne put réussir, son forceps cassa, mais il fut assez heureux de faire changer par ses efforts la direction de la tête, qui sortit tout-à-coup. (A)

Si des praticiens aussi éclairés, et aussi habiles à manier le forceps, n'ont pu dans le cas qui nous occupe, éviter les inconvénients que nous venons de rapporter, que ne doit-on pas craindre, lorsque cet instrument sera dirigé, par une main novice et peu exercée, ou par ces opérateurs qui mettent toute la réussite d'une opération, dans la promptitude avec laquelle ils la pratiquent.

Si l'on voulait faire un peu plus d'attention à la marche de la nature, on verrait que tout l'obstacle vient de ce que le menton a quitté trop promptement la poitrine, et avant

(A) cette observation nous l'a été communiquée lors de notre séjour à Paris.

quel bairut ait gagné l'arade des pubis, de manière que la tête, présente alors un diamètre beaucoup trop grand pour passer le détroit du bassin auquel elle répond. c'est cette position des avantageuse, qu'il faut chercher à corriger dès qu'on s'en aperçoit.

Y parviendra-t-on, en essayant comme le recommande la Motte (A), d'appliquer les deux mains le long des oreilles, afin de saisir la tête pour la faire avancer? pour exécuter cette manœuvre, il faut que la tête soit bien petite, ou le bassin bien large. Dans ces cas là même, la tête peut sortir sans le secours. Si au contraire la tête est volumineuse, ou si le bassin a seulement des dimensions médiocres, comment parviendra-t-on à saisir les mains le long des oreilles. quand on réussirait à les saisir, changerait-on pour cela la mauvaise position de la tête? les mains n'ajouteraient-elles pas au contraire aux difficultés, puisqu'on coupe avec elles tout le ^{plus} large du bassin, et qu'on augmente ainsi les points de résistance?

(B) M. Levret, qui croyait que dans ces cas, les épaules s'élevaient au-dessus du détroit supérieur, et s'opposaient à la descente totale de la tête, recommandait d'aller avec la main ~~latter~~ saisir aux épaules, pour la tirer de côté, et la dégager de dessus le sacrum et le pubis, afin d'en favoriser leur descente et celle de la tête, dans l'arade du bassin. Si l'on ne peut réussir à exécuter cette manœuvre, il conseille alors de faire usage de la tire-tête.

Il nous voutoit fonder l'opinion de ce grand homme, nous observerons que l'obstacle ne peut venir des épaules, puisqu'elles sont encore libres au-dessus du détroit supérieur. en effet tous les accoucheurs savent que la plus grande profondeur du bassin est de cinq toises, et que le sommet de la tête est éloigné au moins de cinq toises des épaules, donc l'on

(A) ch. x page 233 ancienne édition

(B) acc. Lab. page 22.

peut conclure avec certitude, que lorsque la tête n'est arrêtée, et
n'occupe qu'environ le milieu du bassin, l'obstacle ne peut venir
de l'enlèvement des épaules au détroit supérieur.

D'après ces principes incontestables, il est donc inutile
d'employer des instruments, et aucuns efforts sur les épaules
pour leur faire prendre une nouvelle direction, qui ne
remédierait point à la nature des obstacles. tout le mal nous
le répétons vient du trop prompt abaissement du menton.
La tête ne peut se présenter, et s'engager transversalement
sans que les pubis ne soient aplatis en dedans du bassin,
ou le sacrum proéminent, ou acquiert le plus ordinaire
qu'au commencement du travail, le corps de la matrice, ne
se soit trouvé situé obliquement. Dans cet état, la direction
naturelle des forces utérines est changée; le corps du fœtus
se trouvant aussi situé obliquement, ne peut plus être
chassé par elles, selon l'axe du bassin, l'ouïput demeure
ne pouvant avancer dans cette direction, s'arrête dans la
cavité du petit bassin, ou le front plus libre descend trop
promptement, ce qui ne peut arriver sans que le menton ne
quitte trop tôt la voûte (c'est à dire) qu'il faut
réduire à sa flexion naturelle, afin que la tête ne présente
plus son plus grand diamètre, et que la fontanelle postérieure

occupe seule l'étendue du bassin. Pour y parvenir
il faut d'abord remédier à l'espèce d'obliquité de la matrice,
par les moyens convenables, alors les forces utérines seront
dirigées plus convenablement sur le corps du fœtus, qui y
obviendra d'autant plus facilement, qu'il sera lui-même
réduit à une position plus favorable. on aura d'ailleurs
l'effet des contractions utérines, en soulevant le front du fœtus
avec quelques doigts, en le remontant vers le détroit supérieur,
et en le dirigeant en même temps vers la cavité du sacrum; et
même en accablant l'occiput avec quelques doigts ainsi qu'il le recommande M. Daudelorgue,
par ces moyens, le fœtus reprendra la flexion nécessaire,
et l'occiput se présentera le premier au ^{détroit inférieur} ~~détroit inférieur~~.
on aura seulement l'attention de ne manœuvrer, qu'entre
l'intervalle des douleurs. Pendant leur effet, on se bornera
à soutenir le front vers le lieu qu'on aura gagné,
afin de l'opposer de nouveau à son abaissément.
lorsque l'extrémité occipitale sera assez descendue,
pour qu'elle puisse librement cheminer, et s'avancer
sous l'arcade des pubis, alors on abandonnera
l'expulsion de la tête à la nature.



Cette Manœuvre, est aussi simple, qu'elle
est facile à pratiquer avec de la patience; et des efforts bien
menagés, ont vu à bout de l'exécution, lors même

qu'on pourrait prendre un parti contraire.

M. Levret nous en donne un exemple dans la
suivante observation sur les avortements laborieux. (A)
La tête de l'enfant était descendue sans violence, d'une manière qu'elle
arabouait contre les ischium gauche. il fit plusieurs tentatives
pour la faire passer, mais ses efforts lui paroissant inutiles, il alla
appliquer son tire-tête, lorsqu'une perturbation survenue
l'engagea à profiter d'un moment, où tout était en relâche pour
faire quelques tentatives. en effet il porta la main par dessous
la tête de l'enfant, ce qu'il ne pouvait faire sans qu'il ne
relevât nécessairement ce qui se trouvoit qu'il disoit l'obstacle, aussi
la tête s'étant trouvée déplacée convenablement, descendit
tout à coup, et comme il le fit lui même, une incision
suffisante à l'introduction d'une main, procura l'issue
de la tête hors de la vulve.

Il eut été à désirer que ce célèbre praticien, qui
opéra de la même manière dans la première observation
qu'il cite (B) il n'eût pas eu la disgrâce d'immoler avec
son tire-tête un enfant mort, et d'être épargné à sa malade
certaines jours de souffrance.

En pareille circonstance, M. C. Mayré's avait mieux saisi
quelques-uns de ces principes, la manœuvre faite par la nature il rapportait

(A) au lab. page 125

(B) idem page 105.

Dans les cours l'exemple suivant

note dans le cours
de l'élève. Les deux
accoucheurs ont
pu employer le
forceps, mais
sans succès
nous n'en
avons pas
eu l'usage

ayant été appelé par deux accoucheurs, qui dans cette position
transversale de la tête, avaient fait avec le forceps des efforts inutiles
pour l'extraire, et étaient prêts à employer les crochets, ^{et habile}
imitation de Smellie, les pria de temporiser, et le soufflet entendre,
qu'il n'y avait qu'à changer la direction de la tête. Pour y parvenir
il commença d'abord à changer la position de la femme, qu'il fit
coucher sur le côté gauche, la matrice étant inclinée à droite, puis
il repoussa le fœtus vers le détroit supérieur, en le portant vers le
sacrum; alors la matrice dirigeant ses forces relativement à la manœuvre,
l'accouchement se termina en moins de dix minutes; par cette
manœuvre simple, M^r Solayrès eut la consolation d'enlever une
enfant que l'on était prêt à sacrifier.

avant et habile accoucheur, Smellie avait eu le même succès
en pareille circonstance.



Il rapporte (A) avoir été appelé après un accoucheur
qui avait cassé son forceps, et qui avait blessé la tête de l'enfant,
et s'exprime ainsi: " Comme les douleurs étaient fortes, l'orifice
externe, et la partie inférieure du vagin se dilatarent peu à peu,
pour lors je retournai le front en arrière, après quoi la tête avança,
et par ce moyen cette femme se trouva délivrée, environ de une
heure après mon arrivée. &c."

Cette Observation n'est pas la seule de ce genre, que nous

fournit cet auteur? il en rapporte plusieurs autres, ou des
sacoucheurs N'étant servis sans succès des filets, et du forceps,
il était venu à bout de déterminer heureusement l'accouchement, en
portant ainsi le front en arrière, et en rendant au sous-met de
La tête la position convenable. (A)

(C'est en suivant la même pratique, que nous aurons arri-
vée plusieurs fois réunie en pareil cas. qu'il nous soit permis d'en citer
quelques exemples.

en 1780. je fus appelé auprès d'une pauvre femme, qui
depuis cinq jours était dans les douleurs de l'enfantement.
malgré ce laps de temps, elle jouissait de toutes les forces. L'ayant
touchée, je reconnus que la tête était avancée dans le petit bassin,
de manière que l'ouïput répondait à la branche supérieure de l'ischium
gauche, et le front vers pareil os du côté opposé. m'étant aperçu
que son ventre était en besace, je commençai aussitôt à le faire
reléver au moyen d'une serviette, et à maintenir ainsi la matrice
dans une position convenable, qui lui permettait d'agir
efficacement sur le corps du fœtus. je profitai ensuite de
l'intervalle des douleurs pour repousser le front, et le diriger
vers le sacrum. pendant qu'elle agissait, je la maintenais
fortement dans la position que j'avais gagnée, de manière que je
parvins peu à peu, à faire descendre l'ouïput, et quand la protuberance
eut gagné l'arcade du pubis, j'abandonnai le reste de l'ouvrage.

(A) Voyez obs. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. et suivantes.

à la nature, qui termina en moins d'une heure.

(C'est de cette manière que j'en suis venu à bout de terminer plusieurs accouchements de cette nature, sans aucun emploi d'instruments, et l'on verra qu'ils n'ont été inutile. En voici un exemple.

En 1782. je fus appelé pour recevoir une dame de considération, distante de chez moi d'environ cinq lieues. Cette dame, ayant fait une chute, quinze jours avant son terme, se sentit tout à coup malade. elle mençoit d'avorter aussitôt, mais les douleurs redoublant, on manda un accoucheur, qui n'étant distant d'elle que d'une lieue, alla chez elle, trouva la tête enfoncée, les membranes rompues, et la tête enfoncée dans le petit bassin, promit une prompte délivrance, et engagea la malade à faire valoir les douleurs. les efforts furent vains, et ne produisirent aucun avantage. au contraire, une forte hémorragie déclarée, l'accoucheur annonça la nécessité urgente d'employer le forceps. malgré l'invincible des malades, il voulut attendre son arrivée, le forceps fut mis, et conduit sur les côtes du bassin, sans pouvoir entièrement réunir les lames qui manquaient prise au moindre effort. on se disposa à les introduire de nouveau, lorsque j'arrivai. j'embrassai la malade qui étoit plus épuisée, qu'en danger, car la perte étoit très



legere, et les douleurs utérines étaient vives. j'e trouvai la fontanelle antérieure presque au centre du bassin, l'oreille droite vers la symphise du pubis, et le front répondant aux environs du ligament sacrospinale droit. Des lors je représentai à mon confrere qu'il était possible de différer, et d'essayer un moyen plus doux que le forceps. Je lui fis part de ma manœuvre, et le priai de porter à gauche avec les mains, la matrice légèrement inclinée à droit, pendant que j'appuyais deux doigts sur le front, et le soulevais peu à peu vers le détroit supérieur. A mesure qu'il y avançait, je le portais un peu en arrière vers la cavité du sacrum. par cette manœuvre, l'occiput descendit peu à peu et s'approcha de l'arcade des pubis. au moment qu'il s'y présentait, j'abandonnai la tête aux contractions utérines, et en moins de trois quart d'heures l'accouchement fut terminé très heureusement.

On me demandera sans doute, quelle serait la pratique, si une perte considérable, ou d'autres accidents, ne m'auraient pas le temps d'attendre sans risque le redressement de la tête, et l'effet des contractions utérines. Persuadé du mauvais effet du forceps dans ces cas, j'avoue que je n'en ferais pas usage. Si la tête ~~est~~ peut descendre dans le bassin, il paraît préférable d'aller chercher les pieds de l'enfant. Si au contraire la tête est trop avancée, pour qu'elle permette sans risque de retourner ~~la tête~~, dans ces cas l'usage du levier de son truisseau paraît mériter la préférence. en effet le levier appliqué sous la symphise des pubis, de manière à saisir fortement l'apophyse

Mastroide, et plus propre que tout autre instrument, à agir mécaniquement
sur l'ouïe, à le faire baisser, et par conséquent doit nécessairement
s'élèver de front ^{et s'appréhender au menton sa position naturelle} et reculer ainsi la tête à la position favorable en
agissant mieux avec l'évier, ainsi que le recommande M^r Kerbiniou,
en faisant des attractions à soi au moyen d'un lien qui y a été adapté, et
en relevant le manche de cet instrument vers le ventre de la mère, ou
comme la tête est haut en bas, on entraîne plus facilement l'ouïe
sous l'arcade des pubis, d'où il est facile de l'en dégager entièrement
en relevant davantage l'extrémité de l'évier vers le ventre de la femme, et
en opérant ainsi un parfait mouvement de bascule.

En 1783. j'ai été témoin à Rennes, ou quelques affaires m'avaient
appelé, du succès de cette manœuvre, et de cet instrument. M^r Brionne
Professeur d'accouchements en cette ville, fut appelé au secours d'une dame
en travail. D'enfantement, qui éprouvait depuis deux heures, des convulsions
et des faiblesses effrayantes. ayant reconnu que le front du fœtus était descendu
vers la tubérosité ischiatique droite, et que l'ouïe répondait au trou sacré
gauche, il crut devoir hâter la délivrance de sa malade au moyen du
forceps. mais quelques efforts qu'il employa, il ne put jamais passer
une des branches de cet instrument sous le pubis. Dans cette circonstance
il appella en consultation M^r Maugé célèbre accoucheur, qui me vint
de l'accompagner. nous étant assurés de la véritable position de la tête
qu'annonçait M^r Brionne, nous convinmes de l'emploi de l'évier de
Roubaix. M^r Maugé en introduisit la partie fenestrée sous
la symphyse des pubis, de manière à saisir l'apophyse Mastoïde;
quand elle y fut assurée, je me chargeai de maintenir le lien qui sert



adapté, et assésure que cet accoucheur, élevait par petite sautoir le manche de cet instrument vers le ventre de la femme, je faisais mes efforts pour le maintenir appliqué sur la tête, en faisant attraction à moi, lors des contractions utérines. par cette manœuvre, en moins d'un quart d'heure, l'œufut se montra à l'avulve, et à la première vue, cette dame fut délivrée très heureusement.

Néanmoins quelque célèbre paroisso mieux rempli que le forceps c'est qu'on se propose, dans le cas Supposé, nous sommes éloignés de penser qu'il faille en faire un usage trop fréquent. la déchirure du périnée, qui ne peut manquer d'arriver par l'effort que fait contre lui la tête, en sortant trop précipitamment, la contusion de la matrice, de la vessie, et des grandes lèvres, qu'on ne peut quelquefois éviter, sont des inconvénients trop considérables pour l'admettre dans tous les cas, et il faut en apprenne à se servir, ou ne pouvoir mieux faire, pour ne pas en rejeter absolument l'emploi.

D'après les observations que nous avons citées, n'est-il pas permis de croire, que si le forceps à quelque fois réussi dans pareille circonstance, c'est que la tête étoit très petite, ou le bassin très large, de manière que dans l'un ou l'autre cas, la nature eût seule terminée tout l'ouvrage si on l'avait confié à ses soins.

Quoiqu'il en soit, cette position de la tête, dans le petit bassin, n'est pas la seule qui exclue l'usage du forceps. cet instrument n'est pas plus utile, lorsque la tête est arrêtée au détroit supérieur, soit qu'elle ait plus de largeur que le détroit ou elle doit s'engager,

[illegible]

à qu'on ne peut faire, sans supposer des efforts et des Passions énormes
pour la machine, et sans autres vices molles, comme de l'écou
de l'inflammation, et souvent la gangrène, au centre tout-à-fait dangereux.

Mais je suppose comme l'indique un célèbre professeur (A) qu'on applique le
Craquelé au forceps un peu obliquement à côté du Sacrum d'un côté, et d'un ou de l'autre
de l'autre côté; observant ou mieux, nous le voyons. Et l'on s'en rapporte au jugement de
M^r. De la Roche (B) qui fait connaître dans son ouvrage les faits de cette méthode.
En effet, je suppose M^r. De la Roche lui-même observant, qu'il la tête est encore au
côté droit supérieur, il est très difficile d'y placer les branches du forceps, dans la direction
qui est recommandée, l'air est étroit et les parties, et si elle n'est parvenue, alors on s'en
va sous il procèderait; mais je suppose qu'elle s'en soit parvenue, alors on s'en
branches, faisait un des côtés de l'ouïe, et l'autre, les Mûchoires inférieures, demandant
que la tête est incomplètement saisie, et que la moindre attraction doit sûrement leur
faire manquer la prise. à supposer encore qu'on s'en soit parvenue, les cuillères,
et qu'elle tiennent assez pour montrer une attraction efficace, quel peut-être
le fait de la compression, sur une portion de l'ouïe et de la paroi latérale unie, et sur une
partie du crâne à côté opposé. la tête est saisie et comprimée, n'est pas si facile
à saisir, et par conséquent inproportionnelle à son trop de volume, ou d'extension du
bassin, et par conséquent ne peut s'affaiblir assez pour qu'elle puisse franchir
l'obstacle. par cette manœuvre ailleurs, on ne diminue point ainsi qu'il convient,
l'apaisement de la tête, ou coupe au contraire avec l'instrument, une partie de la tête
de la fin que la tête est mouleuse doit naturellement occuper, pour que la sortie puisse
avoir lieu; il est sans doute possible, que si les Cotes pariétales sont engagées au côté
supérieur, il est possible, dis-je, qu'il lors l'application du forceps, une pression pourra
résister, pour que la compression, et que la force que l'on emploiera pour l'attraction
de la tête, à l'importance de la résistance des parois, qui se trouvent serrées, surtout
dans un bassin vicieux, entre le pubis et le sacrum, et qui en outre s'appliquent;
mais je suppose, comme il est facile de juger, sans qu'il arrive fruit
aux os du crâne, ou pour le moins à l'organisation du cerveau du
fœtus, de même qu'à la continuation d'aucune des parties intérieures de la mère.

(A) M^r. De la Roche art. de l'art. 2. éd. page 795.

(B) art. de l'art. page 109.



Enfin et il plus avantageux, comme Mr. l'auquelque lui même l'a vu, qu'il applique ses doigts sur les oreilles. puis nous permettez d'être exposée, que les os parietales soient des os engagés entre le sacrum & le pubis, cette application est non pas plus pénible, et dangereuse, puis que le contact des parties s'oppose à l'écoulement de quelques milles les faisissent. mais opposons que les os parietales soient libres, et que les os du crâne supérieurs, qui se flatteront lors de leur l'adhésion les faisissent, à supposer même qu'ils se joignent, et que la tête ait été réduite avec la main à la position convenable, et oblique gauche à droit, comment se promettra de faire pénétrer derrière la base du crâne les pinces du forceps, d'ailleurs comment les fera-t-on descendre ainsi chargées de la tête. (A) car on ne pourra pas se baïiller assez pour qu'on puisse attirer la tête, dans la direction oblique d'avant en arrière, dans laquelle elle commence toujours à s'engager. si on fait la moindre attraction, de toute nécessité on aura la déchirure: mais cet inconvénient d'art, comment fera-t-on pour faire passer le ventre et l'insubur. et chargée de la tête, dans le diamètre antero-postérieur d'un bassin, qui n'aurait pas exemplé que trois pouces et demi. chaque mille d'un mille trois lignes d'épaisseur, qui ajoutées à l'épaisseur ordinaire de la tête, et l'uniront trois pouces et demi, formeroient un corps d'environ quatre pouces à qui on ne peut faire franchir un étroit de trois pouces six lignes de diamètre. si on y réussit à force de compression, le cerveau peut-il la souffrir impunément, que fera-ce, si le bassin est plus rebelle que nous les opposons, ou la tête plus volumineuse que dans l'état naturel. j'en laisse aux accoucheurs, à déterminer le danger de cette conduite.

Nous observerons seulement que siuëlle, (B) et Levret (C) les premiers auteurs qui aient l'un ou l'autre tout l'avantage qu'on pourrait retirer du forceps, se sont avisés à dire qu'il était inutile et même dangereux de faire usage de cet instrument en pareille circonstance. Le premier s'explique ainsi:

11. Lorsque la tête est restée au-dessus des bords du bassin, ou qu'il n'y en a
- 11 seulement qu'une petite portion qui s'y soit enlancée, et qu'il parait que le bassin
- 11 est trop étroit, ou que la tête est trop grosse, en pareil cas, il n'y a pas moyen de
- 11 sauver l'enfant, quoiqu'on essaye de le décrire au moyen du filet ou du forceps.

(A) Voyez l'écrit de Mr. de Boin aux pages 33 & 34.

(B) Com. par page 270.

(C) art. des acc. éd. de 1761, page 109.

- Neanmoins apres ce precepte, puisé dans l'observation, *finellie* ajoute (A)
- 1) Pour obvier à cet inconvénient, j'ai fait faire une série de forceps plus longs,
 - 2) courbés en tête, et courbés en queue, mais on n'en doit jamais l'usage, excepté
 - 3) lorsque la tête est petite, ou comme nous l'avons déjà observé cy-dessus, lorsque
 - 4) la tête est grosse et qu'elle diminue en plus grande partie que dans l'embarras, les
 - 5) parties de la femme seroient sujettes à s'enflammer et à être contuses, selon
 - 6) y faisait trop violence.

Après ce passage il paraît que *finellie* croyoit aux yeux de ce précepte moins incertain pour une tête peu ou nullement, mais dans ces cas là même, cet instrument est encore plus inutile, puis que cette tête, à raison de sa petitesse, ne peut opposer d'obstacles, et quelle peut être sous les contractions utérines, fait quelle se présente, la première au passage, ou qu'elle s'écarterait si facilement, pour à la plus grande longueur du forceps que *finellie* a le premier reconnu, elle ne peut diminuer les difficultés, puis qu'on a plus de peine à la manier, et qu'il faut toujours en vain l'écarter (sans diminuer d'efforts, et sans danger), il faudra toujours pour en faire l'extraction, employer des efforts considérables, et le plus souvent périlleux; c'est que *finellie* lui-même ne peut s'empêcher d'avouer. (B)

- 7) Dans ce cas là même, dit ce célèbre accoucheur, on peut saisir la tête
- 8) avec cette longue paire de forceps, d'autant que j'en tirant avec beaucoup de force, et
- 9) en serrant bien, on pourra l'arracher, mais une si grande violence est ordinairement
- 10) fatale à la femme, parcequ'elle peut occasionner une si grande inflammation, et
- 11) peut être un si grand débilement des parties, qu'elle tombe en mortification.

Ces accidents qui entraînent occupent toujours la porte de la femme; ou pour le moins la rendent pour l'avis inférieur et souffrante; j'étois sans doute comme ces maux de tête, puisqu'il est en effet, qu'il ne faut jamais tenter de s'en servir, que quand la tête de l'enfant est dans l'extraction.

Malgré ces sages autorités, nous savons qu'après avoir lu l'ouvrage de cet illustre Compagnon, et le tout de cet instrument dans le cas qui nous occupe, et se sont flattés de s'en servir. ils ont été



(A) Comparez page 272.

(B) Comparez page 273.

(C) mm Baudelocque et Delcours.

mes maîtres, j'étois respecté; et j'étois une récompoisance à leur
 talents, tous les éloges qu'ils méritoient incontestablement. Mais ils
 me permettoient d'en dire; que le bassin étoit bien conformé, même très vaste,
 ou que la tête étoit beaucoup plus petite que dans l'état ordinaire. Dans
 ces cas la même, la nature étoit capable de faire ce qu'il étoit à opérer: ou elle
 elle à disposer la tête de l'enfant de manière à pouvoir produire un
 allongement considérable, pour se mouler pour ainsi dire, à l'espèce de
 fœtus, que lui fournit quelquefois le bassin. mais cet allongement s'opère
 par des gradations infinies, et au moyen de contractions ménagées, et
 toujours relatives à la résistance, et aux obstacles, au lieu que les efforts
 de l'enfant sont toujours plus prompts, plus dangereux, et moins
 sûrement dirigés, qu'ils se adresse, et quelque lentement qu'on mette à
 opérer, de manière qu'il n'y a point de parallèle à faire, entre les procédés
 de la Nature, et ceux de l'art.

Smellie qui le premier a eu l'idée de faire usage du forceps, dans
 le cas cité, nous donne lui même plusieurs observations, qui manifestent
 les avantages de la nature, sur tout si elle est combinée.

En effet après avoir précédemment délinéé trois fois au
 moyen des instruments, une femme dont le bassin étoit rétréci d'avant en
 arrière, Smellie dans sa quatrième couche, confie le travail à la Nature,
 et s'exprime ainsi: (A)

- 1) Comme le travail ne traînait que fort peu, j'encourageai la
 1) Malade, en lui disant que j'avois l'œuvre plusieurs enfants, mesme dans des
 1) cas où le bassin seroit plus étroit que la tête, et que j'avois beaucoup
 1) d'esperance de la conduire à un pareil succès.

Smellie ne se trouva pas dans son attente, la tête s'engagea peu
 1) à peu, et s'achèvement s'accomplir heureusement. L'enfant, a-jouté-il
 1) qui étoit fort gros, et dont la tête avoit été extraordinairement allongée,
 1) fut cinq à six minutes avant qu'il commençât à respirer. C'est la femme.



- 11 Continuée sit, Serénité vint incontinent; le coup ne fut, quelle
11 ulcrait sit après les autres (ou be).

Dans l'observation suivante, j'enlève fait voir qu'elle même
même fut morte un an après, dellimée très heureusement. il donne encore
l'histoire d'une femme dont le bassin étoit rebordé devant en arrière, & trois
quart de pouce, qui néanmoins accoucha naturellement, puisqu'elle eut été
putée d'avis au vuant fait moi avec les crochets. (A)

Smellie lui même après avoir mis les crochets en l'arrière par la même
Serénité del'avoit fait, et s'exprime ainsi. (B)

- 11 Quand j'aurais connu l'usage de l'usage, il n'aurait pas eu les mêmes
11 usage dans ce cas, la tête étoit si grosse, et si peu avancée dans le bassin. La suite
11 fut de l'avoit pas attendu plus long temps, car j'ai eu depuis plusieurs cas,
11 ou avec cette patience, la tête est devenue peu à peu, et s'est allée
11 à l'aide des Douleurs.

Nous pourrions citer plusieurs autres auteurs, qui rapportent des
faits semblables; c'est d'après leurs observations, et d'après l'expérience de Smellie,
que nous avons toujours confié avec succès, à la nature, le soin de faire
passer les enfants; nous n'avons jamais craint, de surprendre, et d'aller d'un
dévaincre les obstacles.

Alors M. M. ou nous citons, une dame auprès de laquelle nous vivions
été mariée, vient de se délivrer au bout de quarante huit heures d'extrême,
d'un enfant très volumineux, dont la tête mesurée après l'accouchement, avoit sept
pouces magnifiques & les autres, y compris l'étonnée, & l'extrême de la tête
basse, et deux pouces trois quart de largeur. vingt quatre heures après la
naissance, elle étoit réduite à six pouces de longueur, et avoit alors trois pouces
et une ligne de large. Cette dame que j'étais déjà accouchée d'un enfant
beaucoup plus petit, à les sauter très prochainement en vent, & ainsi, & qu'elle
mesure du bassin, j'ai trouvé que le diamètre antérieur Postérieur étoit d'environ
trois pouces et un quart.

Ceci n'est pas la seule observation de ce genre que nous pourrions citer,
Mais nous nous bornerons à la suivante.

En 1782, on vint me prier d'aller à deux lieues de la ville

ne j'habitais, au secours d'une femme, qui était en travail. Selon l'avis
enfant, depuis quatre à cinq jours, rendue chez la malade; j'eus trouvai
affaiblie. Je donnai beaucoup de remèdes, mais rien ne réussit. La tête se présentait, mais
que. Malgré les douleurs vives qui venaient d'être atténuées, depuis
quatre jours, elle continuait de souffrir, quoiqu'elle eût employé tous leurs
efforts pour l'extraire. La malade, depuis plusieurs heures, n'éprouvait aucune
douleurs utérines; elle était pâle, défigurée, avec un pouls petit et fréquent.
L'ayant touchée, j'ai trouvé toutes les parties extérieures de la génération
extraordinairement gonflées et tuméfiées, le vagin n'était lui-même
et très sensible au toucher. Cherchant avec un doigt à palper la tête, je
rencontrai le cuir chevelu fort tuméfié, et formant une bourse de la grosseur
du poing, très dure, et très résistante, qui commençait à s'engager sous
l'opercule des fesses, ayant cru. Sans vouloir avec le doigt les sutures, il ne me
fut pas possible de le reconnaître; tout le cuir chevelu était gonflé. D'ailleurs
l'orifice utérin y était si intimement collé et tuméfié, qu'il eût été
difficile de faire d'autres recherches. avertis la jeune fille de cette situation, et
l'état d'exténuation qui l'avait jetée dans une espèce d'atonie douloureuse,
me déterminèrent à suspendre, et à lui procurer toutes les forces, et les repos
dont elle avait besoin. L'état du fœtus, me déterminant à le laisser, qui est
si propre à procurer de la détente, et je me contentai de lui faire prendre
dans un bouillon une cuillerée d'eau de Melisse; à laquelle j'ajoutai trois
à quarante gouttes anodines de Sydenham dont j'en étais muni. Je fis en
suite appliquer sur les parties naturelles, et l'entre, des flanelles trempées dans
une décoction emolliente; j'injectai encore dans le vagin d'une décoction de
mucilagineuse de graine de lin. au bout d'une heure la malade s'endormit.
Son sommeil à la vérité très interrompu, dura environ deux heures, après les
quelles les douleurs utérines reparurent faiblement, et n'avaient aucune
action sur l'utérus, qui paraissait inébranlable. En malade qui n'avait pas uriné
depuis environ quinze heures, voulut le faire, mais inutilement. Je lui fis donner
un lavement, qui ne diminua point les angoisses causées d'uriner, ce qui me déterminant
à la saigner. Je fis ensuite les injections, les fomentations emollientes, et
la potion calmante précédentes. La malade fut alors plus tranquille, et dormit
environ trois à quatre heures. à son réveil les douleurs utérines reparurent

elles s'approchèrent peu à peu, et devinrent bientôt très expulsives. à chaque
pouls, le mio chevelu s'avancait sous le pubis, et reculait alternativement, en fin
la protuberance ouipitale s'y engagea, le front fit brillir le serinée; alors en le
soutenant bien, et en le soulévant un peu vers le pubis, la tête se dégagè
entièrement, et le reste du corps suivit bientôt après.

L'enfant dont la tête était allongée comme un saum de saure, ne dormait
au cun siqu'averse; néanmoins les éruptions sur le dos, la vapeur de l'alt'pali volait
fluor, le trachétement des Narines avec une plume, et principalement
L'insufflation de l'air chaud dans la poitrine; continués près d'une demi heure,
lui firent jeter un soupir, qui devint ensuite de plus en plus assuré. après
avoir donné à la mère les soins qu'elle exigeait, j'examinai la tête de cet
enfant; elle avait huit pouces deux lignes de longueur, et deux pouces quatre
lignes de largeur; frappé de ces dimensions, je fus curieux d'examiner l'étendue
du bassin de la mère. en conséquence ayant porté deux doigts dans le vagin, je
trouvai le saum très proéminent vers le pubis. pour moins me tromper, sur
la distance de l'un à l'autre de ces os, je portai à la base du saum, un tuyau de
plume, que je relâchai sous le pubis. alors mesurant sa longueur, j'eus trouvai
trois pouces deux lignes, ce qui indiquait, abstraction faite de trois à quatre lignes
pour l'épaisseur des parties molles, que le bassin n'avait dans son diamètre antéro
postérieur, que deux pouces ou à deux lignes, tout au plus trois lignes, parce que
dans ce cas, le gonflement qui existait aux parties molles, pouvait causer plus de diminution
autour de la mère et l'enfant se bruta très en l'air, ainsi que j'ai appris,
et il y a un an qu'elle m'en a fort encore. de l'avis de l'heureux événement, après deux jours
de travail.

Je demande maintenant à l'homme c'est, si dans cette
Circumstance, le fœtus est protégé avec les mêmes avortons, ou la
Nature, et si la compression subite, quel que soit cet instrument, n'est pas sote
qu'elle à l'enfant, et principalement à la mère, dont les parties naturelles, plus
déjà si tendues, quelle s'abusent durement par suppression d'autre passion,
plus tendues en gangrène, ou sans causer une inflammation mortelle.

Quoiqu'il en soit, si cette observation, et toutes celles que j'ai
citées, et qu'on pourroit augmenter, demontrent quel on pourrait faire



un usage moins fréquent des instruments, elles nous p^résentent d'autre réflexions qui ne sont pas moins intéressantes pour les progrès de l'art.

En effet l'homme est ignare que l'enfantement est assujéti à une suite successive de douleurs plus ou moins considérables; mais fait ou attention que leur violence, est relative non seulement à la constitution générale du sujet, mais encore à l'organisation particulière, et à l'état de la Matrice; il est hors de doute que chaque individu est doué d'une sensibilité particulière, mais cette sensibilité variant à l'infini dans tous les individus, et dans les différents états de la vie, ne doit-elle pas produire différents effets; les effets en eux-mêmes n'ont ils pas des diverses nuances, et ne se manifestent-ils pas sous diverses formes, qui doivent les rendre plus ou moins frappants. une femme jeune et délicate, dont le corps est mobile, sont susceptibles de la moindre impression, ne doit-elle pas être atteinte de douleurs égales ailleurs, à prouver généralement des douleurs plus vives, et des accidents plus formidables, que celle que la même des régimes, et la constitution robuste, rendent susceptible sans danger de plus fortes impressions. À près cette précaution, lorsqu'on voit que dans un accouchement laborieux, cette pauvre femme, de la moindre douleur, n'est pas dans le cas de supporter le travail. si elle éprouve des douleurs plus aiguës, si leurs effets sont plus marqués que chez la saine, est-elle pour cela moins à l'aise dans l'augmentation qu'elle a le dimensioins du bassin, et n'empêche qu'elle ne s'arrête, ne soit-elle pas les mêmes chez toutes les deux, et la Nature n'est-elle pas aussi puissante, pour vaincre toute résistance qu'elle est capable de surmonter. Il est vrai, elle n'aime pas le mouvement, elle aime plus de lenteur, que de vitesse, mais l'ensuit-il que ses efforts soient insuffisants et infructueux; si ils sont trop vifs, ou trop lents, ne peut-on les calmer, ou leur donner plus d'énergie, par l'usage de certains remèdes, ou des toniques selon les diverses circonstances ne pas seconder la Marche de la Nature, n'est-ce pas la contraindre, et lui nuire plutôt que lui être utile? quel danger y a-t-il, d'être tranquille, et judicieux observateur de la Nature, et une saine réflexion, ne surmonte-t-on pas souvent des obstacles qui nous ont paru d'abord insurmontables. De la Mère est au moment présent, dont les observations sont presque autant de règles, connaitrait tout l'avantage qu'il y a d'être patient, patient d'une nature si naturelle, aussi dit-il dans la préface de son traité d'accouchement, « J'ai fait jusqu'à trois et quatre accouchements dans un jour, et repris d'un moment sans à dessein d'arrêter, n'en ai tant senti que deux fois depuis plus de trente ans, et y ayais toujours substitué de la patience, et des moyens plus doux et plus sûrs. » ainsi cette méthode, n'est presque toujours d'une douceur et d'une bonté, ou d'une douceur.

11 Des remèdes confortatifs, et en retirant les enfants, quand leur mauvaise situation

11 La saignée

R La Motte aussi versé dans la pratique des accouchements, à bon sens, et sans
trouble aux moyens de délivrer heureusement les mères, sans employer que deux ou trois
des moyens extrêmes, si les anciens, si l'on n'en excepte quelques uns, ont toujours préféré les
secours médicaux, d'ailleurs dirigés, à une pratique dangereuse et souvent meurtrière, si
Deventer n'a jamais fait usage du cône, si finelle lui-même qui en connaissait si bien tous
les avantages, n'en a pas employé plus de deux ou trois, dans la quantité innombrable de la
accouchements qu'il a terminés, que doit-on penser des accoucheurs d'aujourd'hui, qui en
vingt à trente accouchements qu'ils font par an, font usage des instruments sans pitié
les motifs? (A) Les femmes de notre siècle sont elles moins bien aidées que celles des siècles passés?
non, si l'on voit qu'abandonnées à elles-mêmes, se délivrent seules, les accouchements les plus laborieux,
sont elles extrêmement contrainctes, que les habitantes des villes, et la Nature en aide des secours
que pour les premières, d'ailleurs mieux, elles se délivrent plus heureusement, et que les secondes,
sur lesquelles on n'a pas auprès d'elles ces accoucheurs toujours prêts à venir que la nature
est en effort, et toujours prêts à instrumenter.

Quoiqu'il en soit, la sensibilité nerveuse existante, chez toutes les femmes, sous mille formes diverses,
se manifestant, chez les unes, par des vomissements, des anxiétés, des faiblesses, des douleurs de reins
et chez les autres, par des crampes, des convulsions, ou des troubles particuliers, ne sont pas les
seuls effets des douleurs de l'enfantement, et les seuls symptômes qui retardent les progrès de
l'accouchement, quelquefois c'est la présence de quelques matières avortées, ou de trop long
jour et de vin, qui cause dans les intestins, ou dans la vessie, une irritation considérable, qui
se propage jusques à la matrice, et rend les contractions irrégulières. et trouble est quelque fois
si grand, qu'il occasionne des vomissements, des frissons, et des symptômes qui rendent
toujours la marche de l'accouchement longue et laborieuse, surtout lorsqu'on ne reconnoît point
la nature de l'obstacle; le plus souvent c'est l'amaillonnement prématuré des vaisseaux, qui causant
un obstacle subit à l'utérus, y jette en quelque façon l'obstacle, qui n'éprouve plus alors pendant
un certain tems, l'action du viscère dans lequel il est contenu. L'utérus d'ailleurs, trouvant
plus la même résistance, et son fibro-muscle le plus souvent fatigué, par des efforts rapprochés, il
arrive que les contractions sont languissantes, et presque toujours inefficaces, de quoi quel organe est
et tris à épuiser les forces. d'autres fois c'est la matrice elle-même, qui par l'orgasme change, ou trouble
de change aussitôt la nature de la nature, et la fait devenir nuisible à tout. Les efforts, au lieu de la
matrice, pour faire comme tous les autres organes musculaires, de la queue d'oreillon, tous dès le
premiers instants de la conception à se débarrasser d'elle, qu'elle renferme, et qui est devenu pour elle
un corps étranger. mais ne se résolvant pas, qu'elle n'en est l'irritation, qu'elle n'en est l'obstacle
et la cause dans son état Naturel, n'est pas un effort suffisant, pour rompre les attaches de l'ovaire, et en
causer l'expulsion; si cependant elle se débarrasse quelque fois, ce n'est qu'après qu'on l'a aidée, et l'on en
(A) Les papiers privés ne font mention que d'une application d'opoponax, et d'un des accoucheurs,
qui s'était vu de l'avis employé d'opoponax, sans un motif.

Inverlu contractile, ainsi qu'il arrive lors d'un coup d'une chute. Et ainsi les efforts ne
sont plus contrebalancés, la matrice participant au degré d'irritation, qu'il prouve alors toute la
machine; semblerait plus fortement, et en chassant le corps qui la gêne, cause ainsi l'avortement,
ou l'accouchement prématuré. Le même effet à lieu, si le fœtus, par quelque cause, ne se nourrit, éprouve
une diminution de forces. Dans l'état naturel au contraire le fœtus et des enroulements, prenant un
avancement toujours continu et successif, pousse les fibres utérines de la longueur en proportion, et les
tenant ainsi dans une espèce d'étension qui les empêche d'agir, ils évitent par là l'effet de leur action,
mais l'embryon parvenu à un point de maturité, ou il ne prend plus le même accroissement, alors
les fibres de la matrice, ne tant plus contrebalancées par l'effet de la cause de l'état de la matrice, les fibres utérines
déploient toute leur vertu élastique, elles font alors effort sur le corps passif qui les gêne, et plus elles
trouvent de résistance, plus elles doublent d'action, d'où naissent les douleurs utérines, et l'expulsion
du fœtus par l'endroit le moins résistant. (A) le col utérin, comme la partie la plus mince, la moins
musculaire, et la moins susceptible de contraction, est obligé de fournir le passage, et
c'est en prompt desquels la matrice agit le plus fortement, et selon l'axe du bassin, sur le corps du fœtus, et que
celui-ci lui cède successivement. mais si cette direction vient à changer, ou si les dimensions du bassin,
ou le corps qui doit le traverser, ne sont pas entre elles dans des proportions favorables, alors la résistance
sera plus grande, les contractions seront plus vives et plus douloureuses, la matrice plus fatiguée tombera
dans l'inertie, ou les fibres trop irritées, seront dans un état d'éréthisme, qui ne leur permet plus d'agir
avec efficacité. Dans ces cas, sans recourir à la nature, le tems de réparer les forces, ou au moins le bassin
de vires insurmontables, et sans plus ample considération, on embrasse souvent le parti le plus
violent. (B) quelquefois les fibres utérines, au lieu d'être fatiguées, sont naturellement mal
organisées, ou gorgées de fluides qui leur ôtent toute action. Dans ces cas, leur report ne peut être puissant;
aussi les contractions sont languissantes et, presque sans effet, sur le corps qu'elles tendent à chasser.
ou bien si à quelques fibres utérines moins gorgées que les autres, elles font effort sur les autres.
ne pouvant seules l'emporter, elles se contractent avec les plus faibles, les fibres nerveuses qui les
composent, sont néanmoins irritées, et causent les douleurs les plus aiguës. ces douleurs fatigantes
sont prises le plus souvent pour des contractions, et comme elles ne font aucunement avancer le
travail de l'accouchement, on voit aussi toute la nature en équilibre, et dans tous ces cas, au lieu de
référer, des relaxants, des évacuants, des saignées, des calmants, et des cordiaux selon les
circonstances, qui peuvent changer la face du travail ou calmant l'irritation, ou en enlevant.

(A) Cette manière d'expliquer la cause déterminante de l'accouchement, est sans doute sujette à plusieurs objections,
mais quel est le système établi à cet égard, qui n'en soit pas susceptible. en fait d'hypothèse, chacun à son tour,
d'embrasser le sentiment qui lui paraît le plus probable, surtout lorsqu'il ne conduit point à une fausse pratique.
ou reste de quelque manière que l'on envisage cette fonction, est-il toujours vrai, que les différents changements
que peut éprouver l'uterus, doivent troubler la marche ordinaire de l'accouchement.

(B) Rodericus en donne une preuve effrayante. ch. XII^e. car au lieu des secours et des remèdes analogues
au cas où il se trouvait, il coupe l'enfant par Mordax.

L'usage des *fibres utérines*, ou bien en leur donnant plus de ton, ou en les pressant d'avoir recours à des instruments, qui ne peuvent que les irriter davantage, et donner lieu à des accidents toujours pires, que ceux qu'ils prouverait la nature à la donner à elle-même (A)

On verra sans doute, qu'il y a des pestes, des défaillances, des convulsions, des états spasmodiques, qui sont bien capables d'effrayer. et qui exigent de l'art les secours les plus actifs. Mais ces accidents ne sont-ils pas dangereux, si tant qu'ils sont en froissant, et qu'ils résistent aux moyens sagement dirigés, qu'on a employés pour les débarrasser? combien ne pourrait-on pas alors observer la grâces des mères de sont délivrées très heureusement, et naturellement, quoiqu'avec des vents, et des faiblesses, des convulsions &c. néanmoins on ne peut disconvenir, qu'on se trouve fort embarrassé en pareilles circonstances, et que ces états sont quelquefois si effrayants, qu'ils ne permettent pas d'en comparer le danger avec les ressources infinies de la nature. Dans ces circonstances éprouvées on ne saurait sans doute être blâmé de recourir à l'art, et d'en emprunter les secours les plus convenables. mais parmi ces secours, en est-il de plus doux, de plus sûrs, et de plus faciles à diriger, que les mains? ne sont-elles pas les premiers instruments que nous ait donnés la nature? en est-il de plus propres, à changer la mauvaise position de l'enfant, et à le priver avec sa mère aux dangers qui les menacent.

- 11 Je ne sçavois, dit La Motte, (B) aucune situation de l'enfant, ou un chirurgien expérimenté dans la pratique, ne puisse avec la main, auouches l'enfant.
11 d'un enfant vivant, au lieu qu'il se trouve souvent réduit à voir périr l'enfant, et même
11 la mère dans la situation de la tête.

Il serait à désirer que ce précepte fut toujours aussi heureux entre les mains d'un accoucheur; quoiqu'il en soit, il se faut passer ce qu'on ne puisse aller saisir les pieds, toutes les fois que la tête prononce dans le bassin, ne fût-ce que le détroit supérieur est resserré, ou que la tête est un peu grosse, il arrive que le cou chavale, ainsi que nous l'avons dit, parvient à la vulve, lorsque même que Menton n'a pas encore entièrement quitté la poitrine, et que la base du fœtus est encore au dessus du détroit supérieur. Dans ces cas la matrice n'a point encore abandonné la tête qui peut rentrer dans la cavité, et il est possible alors d'aller saisir les pieds ou les fesses; plusieurs observations ~~ont prouvé~~ de *faucelle* viennent à l'appui de cette vérité; et nous pourrions en citer qui nous sont particulières.

(A) je ne parle point des maladies qui ayant lieu au col de la matrice, au vagin, ou au bassin même, doivent nécessairement retarder les progrès de l'accouchement. il est sensible que ces différents accidents demandent chacun des secours particuliers: il en est de même, lorsque c'est ordinairement à pour origine la saffaction d'esprit: il exige des soins particuliers, qui consistent moins dans les moyens physiques que dans une certaine adresse à calmer les émotions de l'esprit.

N 1778. je fus appelée par une sage femme, au secours d'une pauvre femme
aupres de laquelle elle était depuis trois jours ayant examiné la malade, j'ai trouvé
le visage plein de feu, les yeux étincelants, le pouls dur et irrégulier. n'étant informé de
l'état ou en était l'accouchement, la sage femme me répondit que depuis deux jours
les eaux étaient écoulées, que la tête n'avait avancé que douze à quinze heures après, mais
que depuis ce temps, elle n'avait fait aucun progrès, quoique les douleurs, qui s'étaient
ralenties, eussent été d'abord très violentes. ayant touché la malade, j'ai trouvé le cuir
chevelu dur et rénitent, répondant vers la branche inférieure gauche et subit.
l'orifice utérin était suffisamment dilaté, mais les bords étaient encore durs et serrés.
la tête de toutes parts remuait en palpant avec soin, j'ai reconnu que la suture sagittale
traversait obliquement le bassin, et j'ai touché une des oreilles vers le trou ovalaire droit, ce qui
m'indiquait la bonne position de la tête. d'après l'état de l'enfant ou était la malade, j'en
balanai pas à la saignée; à lui prescrivis un lavement, et une potion saluante. la saignée
faite, j'engageai la malade et la sage femme, à avoir de la patience, et j'en retirai huit à
dix heures après on me renvoya chercher. j'appris que la saignée avait procuré beaucoup de
calme, et que la malade avait dormi deux à trois heures, sans quelle eût pris le
remède que j'avais recommandé, mais que depuis trois heures ayant souffert de
douleurs violentes, sans que la tête eût avancé, la sage femme m'a dit qu'elle était épuisée d'attendre
avec long temps, et avait été chercher les pieds de l'enfant. effectivement elle en
avait amené un dans le vagin, mais elle ne pouvait, me dit-elle, le faire
descendre plus bas, ni saisir l'autre. j'essayai de le faire, en élevant davantage la tête,
qui se trouvait alors en position oblique au-dessus du détroit supérieur, et en la
dirigeant vers la fosse iliaque gauche; alors parvenant au col du fœtus, j'ai pu
bientôt le saisir, ainsi que la jambe, que j'ai fléchie, et que j'ai tirée dans le vagin;
alors la femme enfant à la première, j'ai terminé bientôt l'accouchement. l'enfant
était en vie, la tête avait les dimensions ordinaires, seulement il y avait au
cuir chevelu, une tumeur assez considérable qui occupait particulièrement
l'angle postérieur inférieur du parietal droit.

N 1777. Si cette sage femme avait eu un peu plus de patience, il n'est pas
douteux que la nature eût terminé seule tout l'ouvrage, mais cette observation ne
prouve pas moins, qu'on peut aller saisir les pieds de l'enfant, lorsqu'une fois la tête est avancée
dans le bassin, et lorsqu'une fois le cuir chevelu s'est avancé à la vulve, ainsi que l'observation
suivante le confirme.

N 1777. Le Professeur, sous lequel j'ai appris à Rennes

les premiers éléments de la chirurgie, fut appelé au secours d'une femme qui étoit depuis quarantehuit heures, dans le travail le plus pénible? quelques affaires l'empêchant d'y rendre, il me pria de le remplacer. Je me rendis avec un de mes amis, avec lequel j'avois fini mes études à Paris. Nous trouvâmes la malade dans les plus grandes anxiétés, et avec un poulx très foible et très petit. Les contractions utérines étoient faibles, et néanmoins on ne peut plus douloureuses. Les parties naturelles avoient été peu ménagées par la sage-femme, et étoient très tuméfiées, et très sensibles au toucher. La tête se présentait, et le fœtus se voyoit tuméfié & saillie près la commissure antérieure des grandes lèvres. L'orifice utérin étoit assez dilaté, très mince, mais si intimement collé à la tête, qu'il nous fut impossible d'en reconnoître la vraie position.

L'imagination frappée des avantages du forceps, mon ami crut que l'état déplorable de la malade, en exigeoit absolument l'emploi; me trouvant d'un sentiment contraire au sien, et d'ailleurs étimé par la confiance que j'avois dans les lumières, et la prudence du célèbre professeur, qui m'avoit confié la malade, je ne voulus rien entreprendre sans son avis. en conséquence s'étant rendu à notre prière, et après avoir vérifié l'état de la malade, il m'engagea avant d'employer le forceps, à chercher à repousser la tête, et à aller chercher les pieds de l'enfant, en nous rappelant qu'en pareille circonstance, la base du crâne se trouvoit souvent au-dessus du détroit supérieur, et permettait s'engager dans la matrice, ainsi qu'il s'avoit plusieurs fois éprouvé. D'après ce conseil, je me mis à la besogne; je voulus soulever la tête qui me parut d'abord innébranlable; mais agissant avec légèreté, je parvins peu à peu à la faire remonter au-dessus du détroit supérieur. alors j'essayai de la placer dans une des fosses iliaque, mais la matrice étoit si vivement contractée sur le corps de l'enfant, qu'il me fut pas possible de la porter jusques là. je me contentai donc de la soutenir au-dessus de la



marge du bassin avec le doigt, tandis qu'avec les doigts placés sur
la poitrine, je parvins successivement à l'un des côtés de l'enfant, et
parcourant cette surface, je saisis le pied correspondant. Je l'attirai d'abord
vers le détroit supérieur, et j'essayai ensuite d'y amener l'autre.
ne pouvant y parvenir, je cherchai d'attirer ^{le pied} ~~le pied~~ ^{dans le vagin} ~~le pied~~ ^{saisi}, ~~mais~~
mais ce fut encore inutilement. à mesure que je baissais la main, l'enfant
se entraîner, la tête ne trouvant plus de soutien, retombait
au niveau du détroit supérieur, et s'opposait à l'advenue du pied qui
en se happait. Dans cette circonstance, ne pouvant trouver l'autre pied,
nous plaçâmes davantage la tête, les Messieurs qui étaient présents,
me conseillèrent de porter un lac sur le pied saisi, afin qu'on lui
attirât suolui, tandis que je soulèverais de plus en plus la tête, avec
la main qui l'aurait placée. Je portai donc sur ce pied un lac, sur le
quel ces Messieurs firent des attractions ménagées, pendant que je
soulèvais la tête. par cette manœuvre le pied descendit dans le vagin,
la tête remonta davantage dans la matrice, et me donna la liberté de
saisir l'autre pied, que je réunis au premier saisi, et je terminai bientôt
l'accouchement, qui malgré ces différents obstacles, ne dura pas plus de
vingt minutes, et procura à la mère un enfant vivant, et bien
constitué.

Il serait facile de citer plusieurs autres observations de ce
genre, et on des pertes, des convulsions &c. nous ont forcé d'aller saisir
les, et os, lorsque même que la tête était très avancée. on nous dira sans doute
que cette opération est si souvent dangereuse pour l'enfant, qu'il est
de la prudence de ne pas la tenter aussi souvent. mais ce danger ne tient-il
point à la mauvaise manœuvre que l'on emploie ordinairement
pour l'extraction de l'enfant, et principalement celle de la tête. en effet
l'allongement des ligaments vertébraux, et le tiraillement de la moëlle

épineuse, & attongée, ne sont ils pas toujours les signes d'une attraction forcée
 du fœtus, & les épaules de l'enfant, et néanmoins ils ne sont pas tout le mal. ne
 l'enlèverait on pas, si une fois les pieds amenés dans le vagin, on soufflait
 ensuite à la nature les pulsions & l'écoulement de l'urine, surtout lorsqu'on a la bonne position,
 la pulsation du cordon, les forces de l'enfant, et les naturelles & adjuvantes qu'elle
 éprouve le permettent. en ne manœuvrant d'ailleurs que convenablement avec
 les contractions utérines, qu'on peut solliciter avec une main appliquée sur
 le ventre de l'enfant, et en comprimant mollement la matrice, en agissant
 ainsi, n'emploierait on pas beaucoup moins d'efforts, pour faire descendre
 le corps du fœtus, ne manœuvrerait on pas les forces de l'enfant, & n'engagerait on
 pas la matrice de l'état dangereux & inutile, à laquelle elle est exposée
 lorsqu'on la vuide trop subitement. enfin pour mettre le mûre & allongée,
 à l'abri de toute extension, n'est il pas positif le usage immédiate
 de la tête afin de la faire descendre, ou ne répondra sans doute qu'à des coups
 à cet avantage. mais nous répétons, nous sommes bien éloignés de
 penser que cet instrument convienne dans tous les cas. en effet que la tête
 se présente la première, ou qu'elle se présente, qu'après la sortie de l'enfant,
 cet instrument présente toujours des inconvénients; on a toujours à craindre
 le déchirement des parties naturelles de la mère, son peu de prise, ou
 son mauvais effet sur la tête du fœtus, enfin la même impossibilité
 de la saisir au strict nécessaire, et de la faire descendre, chargée d'une
 tête par exemple qui sera un peu grosse, ou qui sera traversée d'un
 dont les dimensions seraient resserrées.

La cause de ces inconvénients est consignée dans
 une observation de M. M. (A) ou il dit avoir employé lui même
 dans ces cas le bouc dans aucun succès, et être parvenu ensuite
 à faire l'extirpation de la tête avec les mains. ce sont elles qui sont
 l'instrument par excellence, et qui peuvent rendre le meilleur service.

ce sont elles seules, qui peuvent maintenir, et placer la tête dans la position la plus favorable, pour qu'elle puisse s'engager aisément. L'usage ordinaire, pour y réussir, la méthode que l'on emploie, est bien différente (selon l'usage, d'ailleurs qui est convenable), et l'on se prévient les inconvénients qu'on cherche à éviter, on s'expose au contraire à s'entraîner de la manière déprimée et allongée. Pour s'en convaincre, il suffit de considérer la manœuvre que l'on suit ordinairement. en effet, lorsque les pieds sont hors la tête, on s'empresse aussitôt de tirer en bas le corps du enfant, et de lui faire subir plusieurs mouvements de rotation, qui ne peuvent que fatiguer la moelle épinière; d'un autre côté, lorsque les bras sont dégagés, on saisit aussitôt la mâchoire inférieure, et tirant quelque main l'on abaisse menton sans la poitrine, on s'empresse de l'autre main d'empoigner les épaules, pour faire attraction sur la tête. Par ce procédé, le plus grand effort, ne se passe-t-il pas principalement sur l'occipital, qui s'élève continuellement au col, sans lequel on attire; mais l'occiput obligé de résister plus qu'il ne peut, de la tête, ne peut le faire sans que celle-ci, (comme on s'en convaincra aisément par l'autre main,) représente la plus grande longueur (cinq toises et demi, au minimum oblique du bassin qui n'a de largeur qu'environ quatre pouces et demi, cinq toises). Dans ce cas restant-il possible les plus grandes forces, pour que la tête puisse passer dans cette direction, qu'on a - ce. Si la tête est un peu grosse, ou le bassin étroit; n'est-il pas évident qu'il y aura de grands efforts pour réussir, et pour amener le fœtus dans le sacrum, plus on allongera les ligaments cervicaux, et plus la moelle allongée souffrira d'entraînement direct.

Pour éviter ces inconvénients, je suis davis ma pratique, un peu différente, tout contraire. en effet après avoir confié à la nature, autant que les circonstances le permettent, les pulsions du corps en fœtus, j'en dégage les bras, j'introduis ensuite une main sous la poitrine, et avançant les doigts, le long de la partie antérieure du col, jusques au visage, j'examine alors dans quelle position il se trouve, afin de retourner

vers un des échancrures ~~lombaires~~ sacro-lombaires, ce qu'on peut faire, dans quelque position qu'on trouve la tête, lorsqu'on veut faire aucune attraction sur elle, ou la relever plutôt au dessus du détroit supérieur, ou étant immobile, elle peut prendre la position la plus avantageuse. une fois la tête saisie, d'une manière que le visage repose à l'un des échancrures sacro-lombaires, j'applique le doigt indicateur, et le doigt médium sur les parties latérales d'un nez, et le doigt annulaire dans l'intérieur de la bouche; le visage ainsi saisi, j'introduis un à deux doigts de l'autre main sous la symphyse des pubis, en les portant et les dirigeant le plus haut possible sur l'occiput, ou à sa base, afin de l'affaisser, et de le comprimer de haut en bas, et de devant en arrière, alors lorsqu'une contraction utérine s'annonce, avec les doigts appliqués sur le visage et dans la bouche, je flexis le menton sur la poitrine, et j'abaisse le front et le dirige vers la cavité du sacrum. il y descend d'autant plus facilement, qu'on l'en a d'abord moins éloigné, et qu'on a l'attention à mesurer que la tête baisse, d'avancer de plus en plus les doigts sur l'occiput, afin d'en mieux l'affaisser, et de faire baisser le front davantage. j'ai soin d'en manifester quand les circonstances le permettent, que d'acquiescer avec les contractions utérines, qui seules suffisent le plus souvent pour opérer la sortie de la tête. j'ai encore l'attention de relever le corps de l'enfant vers le ventre de la mère, en proportion que le front descend dans la cavité du sacrum. une fois qu'il y est descendu, on n'a plus qu'à le relever un peu le corps de l'enfant, en faisant attraction à soi avec l'autre main qui a saisi les épaules, par ce moyen le visage se présente bientôt à la vulve, et l'extraction antérieure de la tête est bientôt terminée.

Cette Méthode est aussi facile à exécuter, qu'elle est favorable pour la mère, et pour l'enfant; en effet après avoir saisi le visage, comme nous l'avons recommandé, il n'est pas difficile de passer encore les doigts de l'autre main sur l'occiput, ou vers sa base, parce que la symphyse des pubis, sous laquelle on les introduit, est absolument libre, et y présente un vuide suffisant pour la place des doigts indicateur et médium; en relevant ainsi avec eux l'occiput vers la marge du bassin, on l'empêche de s'avancer vers la cavité fœtale, et trop avant dans la cavité du petit bassin, d'une manière que l'on suppose non seulement à ce que le grand diamètre de la tête se présente au détroit supérieur,



mais encore à ce que ^{Le diamètre} ~~le diamètre~~ ^{du petit bassin} ~~la tête~~ vienne répondre à un des plus
petits du détroit inférieur; enfin on contribue essentiellement à la flexion
du menton sur la poitrine, et à l'épave de bascule que doit faire le front sous
selogues; et route ensuite pour ainsi dire, dans la cavité du sacrum.

Cette méthode est encore favorable, en ce que la tête en
descendant dans le bassin, ne le fait que par l'extrémité d'un des le
petits diamètres, puisque c'est l'extrémité inférieure d'un diamètre
perpendiculaire, qui s'y engage la première. par cette manière, on
maintient encore la tête dans une telle situation, que dans un bassin
resserré d'avant en arrière, (Vie le plus ordinaire) rien ne l'empêche
de s'allonger suivant sa longueur. en effet, le diamètre transversal de la
tête se trouve toujours répondre à l'un des obliques du bassin, qui étant
le plus grand ordinairement, empêche que les frottements soient
considérables, et à mesure que le front avance dans la cavité du sacrum,
les bosses pariétales cheminent vers le diamètre transversal du bassin,
qui dans le cas d'une déformité supposée, d'une étendue plus que
suffisante pour leur libre passage.

Ces différents avantages ne sont point imaginaires,
et je pourrais en citer un grand nombre de preuves, parmi les quelles
je me borne aux suivantes.

En 1776. je fus appelé par une sage femme, au secours d'une pauvre
femme, qu'elle ne pouvait délivrer entièrement. en essayant d'être obligée d'aller
saisir les pieds de l'enfant, qui présentait un bras, elle n'avait pu parvenir à extraire la
tête, malgré les efforts violents qu'elle avait employés. ayant introduit deux doigts dans le
bassin, je remarquai que le sacrum s'avancait vers le pubis et diminuait l'étendue
comprise entre les deux os, d'environ un quart de pouce. la tête avait été attirée
selon le diamètre transversal du bassin, et son puit y était un peu engagé;
j'en appliquai aussitôt, à le reporter au dessus du détroit

supérieur, et j'y parvins en faisant effort sur lui, et en refoulant un seul
col de l'enfant dans le vagin. L'ouïput élève au dessus de l'étrémité, je portai
d'abord deux doigts d'une main aux côtés d'un nez, et dans la bouche, et deux
autres de l'autre main sur l'ouïput. La tête ainsi saisie, je tournai le visage
dans l'échancrure sacro-sacrale droite, ayant soin de faire suivre au corps
de l'enfant le même mouvement de rotation, alors profitant d'une contraction
utérine, et engageant la femme à la faire valoir, je baissai et je soulevais
l'ouïput, tandis que je faisais attraction sur le visage, et que je cherchais
de plus en plus le menton sur la poitrine, par ces moyens, le front s'abaissa
dans la cavité du sacrum, alors en relevant davantage le corps de l'enfant
sur le ventre de la mère, et en faisant attraction à moi, je parvins sans
beaucoup de peine à faire l'extraction de la tête.

L'enfant était en vie, et en eut joui plus long temps, qu'il
ne le fit, si la sage femme eut fait moins d'efforts sur l'arrière allongée.

Deux ans après, la même femme étant en travail d'enfantement
eut recours à Mr Mauge célèbre accoucheur, qui trouvant les genoux de
l'enfant, à l'orifice de la matrice, fit bientôt l'extraction du corps, et
dégagés les bras; parvenu à la tête, il y trouva une si grande résistance,
que malgré la bonne direction qu'il lui avait donnée, et les attractions
qu'il faisait sur les épaules, et le col, il désespéra d'en venir à bout.
Instruit du succès que j'avais eu précédemment, il me fit brev de me
rendre auprès de lui; alors en manœuvrant comme j'en ai indiqué cy
dessus, nous parvîmes bientôt à faire l'extraction de cette tête, qui
était beaucoup plus volumineuse que la première, l'enfant malheureusement
était mort.

Trois ans après, cette même femme étant encore malade d'accoucheur,
eut recours à une sage femme qui l'abandonna, parce qu'elle ne put aller
saisir les pieds de l'enfant qui présentait le col. Le praticien précédent fut
appelé, et dans son absence, Mr. Blin accoucheur très avantageusement



Commu, fut mandé. Le Corps et les bras de l'enfant furent bientôt
degagés par cet accoucheur, mais la tête lui offrant de la résistance,
et faisant comme à l'ordinaire ses attractions sur le col, il employa
des efforts si prompts et si considérables, qu'il separa les vertèbres cervicales.
Pour reparer ce desordre inattendu, M^r. Mauge et moi fumes mandés
de nouveau; alors combinant les efforts comme nous l'avions fait
ensemble trois ans auparavant, nous vinmes bientôt à bout de
terminer cet accouchement.

La mere ne fut pas plus heureuse que l'enfant; quelques
heures après sa délivrance, il lui prit des vomissemens, qu'aucuns
remèdes ne purent arrêter, et vingt quatre heures après, elle perit dans
les mêmes vomissemens, causés sans doute par l'inflammation
de la Matrice.

Quoiqu'il en soit, persuadé qu'on peut contribuer
aux progrès de l'art, en recherchant les moyens de simplifier, ou
d'éviter une opération, j'ai hasardé ce mémoire. j'en ai pu y conseiller
de prendre pour règle de conduite le passage de l'œuf d'écure, qui est vers
le milieu de la page 273.

- 11 il y a tel Chirurgien, qui peut, sans chercher à en imposer,
- 11 Servant d'avoir accouché heureusement six cent femmes, dans
- 11 l'espace de quelques années, à l'aide du forceps.

Si la chose est possible, du moins faut-il avoir la plus grande
attention, à distinguer les cas qui nécessitent absolument l'emploi
de cet instrument, de ceux où il peut estre dangereux, ou inutile. je
crois même qu'on ne saurait trop le démontrer aux jeunes Praticiens,
naturellement portés à l'emploi des instruments.

Bonnieu
An. 1792. F. D. G.